



ကလေးနိုးသွားနှင့် လူကြီးသွားများအတွက်သင့်လျော်သောအချိန်

ဤအချက်အလက်သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ကလေးငယ်အသက်အရွယ် (ရွက်ကြေ) နှင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (အမြဲတမ်း) သွားများ ပါးစပ်ထဲတွင် ပေါ်လာနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ယေဘုယျလမ်းညွှန်ချက်ပေးထားသည်။

ကလေးတစ်ဦးစီသည် တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ပြီး ဤဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်ထက် ငှင်းတို၏သွားဘက်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ပိုမိုမြန်ဆန် သို့မဟုတ် နှေးနိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ သွားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးခြင်း၊ သွားပေါက်လာမှုအကြိမ်များ သို့မဟုတ် အဆက်မပြတ်ထွက်နေသော သွားများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်စိုးရိမ်မှုများရှိလျှင် သွားဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ များသောအားဖြင့် ကလေးများသည် အသက် 3 နှစ်တွင် ငှင်းတို၏ ကလေးသွားများအားလုံး ပေါက်လေ့ရှိသည်။

အသက်ခြောက်နှစ်မှ ခုနစ်နှစ်ဝန်းကျင်တွင် ပထမဆုံး အရွယ်ရောက်ပြီးသော အံသွားပေါက်သည်။ ဤသွားများသည် ဒုတိယကလေးအံပေါက်တစ်ခုစီ၏ နောက်ဘက် (ပါးစပ်၏နောက်ဘက်၊ အပေါ်နှင့်အောက်၊ ဘေးတစ်ဖက်စီတွင်) ပေါက်ကြသည်။

အရွယ်ရောက်ပြီးသော သွားများသည် ကလေးသွားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရောင်ပိုမည်းလာတတ်သည်။


ပိုမိုသိရှိလိုပါက

- သင်၏ သွားဆရာဝန်ထံ ဆက်သွယ်ပါ
- www.health.qld.gov.au/oralhealth သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ
- လျှို့ဝှက်ကျန်းမာရေးအကြံဉာဏ်ရယူရန် 13 Health (13 43 25 84) သို့ တစ်ရက်လျှင် 24 နာရီ၊ တစ်ပတ်တွင် ခုနစ်ရက်ခေါ်ဆိုပါ
- oral_health@health.qld.gov.au အီးမေးလ်ပို့ပါ

© The State of Queensland, Queensland Health, 2024.



ကလေးသွားများပေါက်ခြင်း



အရွယ်ရောက်ပြီးသော သွားများပေါက်ခြင်း

